เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน

อาการไข้ เป็นปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนเกือบทุกชนิดดังนั้นหาก มีไข้ สามารถช่วยลูกได้โดยเช็ดตัวลูกด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆและให้กินยาลดไข้ซึ่งอาการมักจะหายไปใน 2-3 วัน**แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกรณีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักด้วย หากเกิดอาการชัก ให้รีบพาเด็กมาพบ แพทย์ ด่วน (รพ.พนมสารคาม 038551444)**

งานเภสัชกรรม 45/02/58

เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน

อาการไข้ เป็นปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนเกือบทุกชนิดดังนั้นหาก มีไข้ สามารถช่วยลูกได้โดยเช็ดตัวลูกด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆและให้กินยาลดไข้ซึ่งอาการมักจะหายไปใน 2-3 วัน**แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกรณีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักด้วย หาก เกิด อาการชัก ให้รีบพาเด็กมาพบ แพทย์ ด่วน(รพ.พนมสารคาม 038551444)**

งานเภสัชกรรม 45/02/58

เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน

อาการไข้ เป็นปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนเกือบทุกชนิดดังนั้นหาก มีไข้ สามารถช่วยลูกได้โดยเช็ดตัวลูกด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆและให้กินยาลดไข้ซึ่งอาการมักจะหายไปใน 2-3 วัน**แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกรณีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักด้วย หาก เกิด อาการชัก ให้รีบพาเด็กมาพบ แพทย์ ด่วน(รพ.พนมสารคาม 038551444)**

งานเภสัชกรรม 45/02/58

เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน

อาการไข้ เป็นปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนเกือบทุกชนิดดังนั้นหาก มีไข้ สามารถช่วยลูกได้โดยเช็ดตัวลูกด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆและให้กินยาลดไข้ซึ่งอาการมักจะหายไปใน 2-3 วัน**แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกรณีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักด้วย หาก เกิด อาการชัก ให้รีบพาเด็กมาพบ แพทย์ ด่วน(รพ.พนมสารคาม 038551444)**

งานเภสัชกรรม 45/02/58

เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน

อาการไข้ เป็นปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนเกือบทุกชนิดดังนั้นหาก มีไข้ สามารถช่วยลูกได้โดยเช็ดตัวลูกด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆและให้กินยาลดไข้ซึ่งอาการมักจะหายไปใน 2-3 วัน**แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกรณีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักด้วย หาก เกิด อาการชัก ให้รีบพาเด็กมาพบ แพทย์ ด่วน(รพ.พนมสารคาม 038551444)**

งานเภสัชกรรม 45/02/58

เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน

อาการไข้ เป็นปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนเกือบทุกชนิดดังนั้นหาก มีไข้ สามารถช่วยลูกได้โดยเช็ดตัวลูกด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆและให้กินยาลดไข้ซึ่งอาการมักจะหายไปใน 2-3 วัน**แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกรณีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักด้วย หาก เกิด อาการชัก ให้รีบพาเด็กมาพบ แพทย์ ด่วน(รพ.พนมสารคาม 038551444)**

งานเภสัชกรรม 45/02/58