

## วิธีการผสมยาฆ่าเชื้อชนิดผงแห้ง

1. คว่ำขวด และเคาะก้นขวดเบาๆ ให้ผงยากระจายตัว ไม่เกาะกันเป็นก้อน เวลาผสมน้ำผงยาจะได้ละลายได้ง่าย
2. ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ำสะอาดบรรจุขวดปิดสนิทที่มีขายอยู่ทั่วไป (ห้ามใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพราะอาจทำให้ยาเสียได้) เติมนลงในขวดยาให้ท่วมผงยา (ประมาณครึ่งหนึ่งขวดยา) ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าขวดให้ผงยาละลาย หรือเข้ก้นกับน้ำได้ดี
3. เติมน้ำอีกครั้งจนถึงขีดที่กำหนดไว้ที่ขวดยาหรือฉลากยา
4. ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าขวดให้ผงยาละลาย หรือเข้ก้นกับน้ำได้ดี
5. หากระดับน้ำลดลงไปต่ำกว่าขีดที่กำหนดไว้ที่ขวดยาหรือฉลากยา ให้ทำข้อ 3 และ 4 ซ้ำอีกครั้ง เท่านั้นยาก็พร้อมใช้แล้ว
6. กรณีที่ได้รับยาชนิดเดียวกันมากกว่า 2 ขวด ต้องรอให้รับประทานขวดแรกหมดก่อน จึงผสมยาขวดต่อไป




## วิธีการผสมยาฆ่าเชื้อชนิดผงแห้ง

1. คว่ำขวด และเคาะก้นขวดเบาๆ ให้ผงยากระจายตัว ไม่เกาะกันเป็นก้อน เวลาผสมน้ำผงยาจะได้ละลายได้ง่าย
2. ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ำสะอาดบรรจุขวดปิดสนิทที่มีขายอยู่ทั่วไป (ห้ามใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพราะอาจทำให้ยาเสียได้) เติมนลงในขวดยาให้ท่วมผงยา (ประมาณครึ่งหนึ่งขวดยา) ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าขวดให้ผงยาละลาย หรือเข้ก้นกับน้ำได้ดี
3. เติมน้ำอีกครั้งจนถึงขีดที่กำหนดไว้ที่ขวดยาหรือฉลากยา
4. ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าขวดให้ผงยาละลาย หรือเข้ก้นกับน้ำได้ดี
5. หากระดับน้ำลดลงไปต่ำกว่าขีดที่กำหนดไว้ที่ขวดยาหรือฉลากยา ให้ทำข้อ 3 และ 4 ซ้ำอีกครั้ง เท่านั้นยาก็พร้อมใช้แล้ว
6. กรณีที่ได้รับยาชนิดเดียวกันมากกว่า 2 ขวด ต้องรอให้รับประทานขวดแรกหมดก่อน จึงผสมยาขวดต่อไป




## วิธีการใช้น้ำสำหรับเด็ก

1. ปิดฝาให้แน่น เขย่าขวดก่อนใช้ยา
2. เปิดฝาขวด รินยาใส่ช้อนยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง (1 ช้อนชา = 5 ซีซี. ให้ตวงยาให้เต็มขอบบนช้อนพอดี) หรือใช้กระบอกฉีดยาตูดยาออกจากขวดตามขนาดที่แพทย์สั่ง ให้เด็กรับประทานตามทีเภสัชกรแนะนำ
3. หลังใช้ยาปิดฝาขวดให้สนิท เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดา หรือตามที่เภสัชกรแนะนำ
4. ล้างช้อนยา หรือกระบอกฉีดยา ให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าทุกครั้ง หลังใช้
5. ยาฆ่าเชื้อควรรับประทานติดต่อกันทุกวันจนยาหมด



## วิธีการใช้น้ำสำหรับเด็ก

1. ปิดฝาให้แน่น เขย่าขวดก่อนใช้ยา
2. เปิดฝาขวด รินยาใส่ช้อนยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง (1 ช้อนชา = 5 ซีซี. ให้ตวงยาให้เต็มขอบบนช้อนพอดี) หรือใช้กระบอกฉีดยาตูดยาออกจากขวดตามขนาดที่แพทย์สั่ง ให้เด็กรับประทานตามทีเภสัชกรแนะนำ
3. หลังใช้ยาปิดฝาขวดให้สนิท เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดา หรือตามที่เภสัชกรแนะนำ
4. ล้างช้อนยา หรือกระบอกฉีดยา ให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าทุกครั้ง หลังใช้
5. ยาฆ่าเชื้อควรรับประทานติดต่อกันทุกวันจนยาหมด



หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาควรปรึกษาเภสัชกร

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาควรปรึกษาเภสัชกร



