

โรคไข้เลือดออก



โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด เป็นแล้ว เป็นได้อีก


มีอาการเหล่านี้ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะคุณอาจเป็น "ไข้เลือดออก"



วงจรการเกิดไข้เลือดออก



วิถีชีวิตของยุง



ไข้มากกว่า 37.5 องศา เมื่อเช็ดตัวลดไข้ และรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด นาน 2-3 วัน

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร

หน้าแดง ตัวแดง

ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ภาวะช็อกช่วงไข้ลด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว

ตับโต มักรกกดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

- ยังไม่มียาฉีดป้องกัน
- เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ทำให้เสียชีวิตได้
- ดีที่สุดคือป้องกันดีกว่าแก้

กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ ทำได้ด้วยมือคุณ



สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

- มีไข้ ไข้แต่ยาพาราเซตามอล
- ดื่มน้ำมาก ๆ หรือน้ำเกลือแร่ทดแทน
- อย่าใช้ยาแก้ปวดพวก **ไอบูโพรเฟนหรือแอสไพริน**
- อย่าใช้ยาชุดแก้ไข้
- ทานยาไข้ไม่ลดเช็ดตัวลดไข้
- ปวดท้อง ซึมลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ไข้ลดลง



ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลพนมสารคาม